



Грозница Западног Нила (*Febris West Nile*) припада групи векторских, природножаришних зооноза. Вирус који изазива ово обољење се одржава у природном циклусу између бројних врста птица селица (дивље патке и гуске, гаврани, свраке, чавке, домаћи и дивљи голубови) и комараца. Главни вектор, односно преносилац је *Culex pipiens*

, врста комарца која је одомаћена и код нас. Главни резервоар заразе су различите врсте птица у којима се вирус одржава, док је човек случајни, односно тзв. слепи домаћин, јер се инфекција вирусом Западног Нила са њега даље не преноси. На територији наше земље обољење се региструје током топлих месеци, од маја до октобра/новембра. Период од заражавања до појаве болести (инкубација) траје од 2 до 14 дана, док код имунокомпромитованих особа може износити и неколико недеља. У највећем броју случајева (70- 80%) не долази до испољавања симптома и знакова болести (тзв. инапаратне инфекције). Код око 20% инфицираних јавља се блага, неспецифична болест слична грипу, која пролази без последица након 5-7 дана. Инфекцију прати повишена телесна температура и знаци опште инфекције (главобоља, малаксалост, слабост, болови у зглобовима и мишићима). Могу се јавити и осип на трупцу и екстремитетима и дијарејалне тегобе.Ма

њ
и проценат
(